



## Kötelező védőoltások az oktatási intézményben

### 6. évfolyamos tanulók:

- **MMR védőoltásra kötelezettek** a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5.§ és 15.§ alapján iskolai kampányoltás keretében.

A **kanyaró** (morbilli, **M**) 9-10 napos lappangási idő után lázzal, köhögéssel, huruttal és kötőhártya-gyulladással kezdődik, majd pár nap múlva a fül mögött kezdődő és az egész testen végigvonuló kiütések lépnek fel. Súlyos betegség, mely könnyen átvihető egyik emberről a másikra.

A **járványos fültőmirigy gyulladás** (mumpsz, **M**) 2-3 hét lappangási idő után lázzal és az egyik, majd a másik oldali nyálmirigy duzzanatával jár. Fiúknál a betegség szövődményeként jelentkező heregyulladás súlyos következményekkel járhat.

A **rózsahimlő** (rubeola, **R**) lappangási ideje 2-3 hét. Gyermekeknél enyhe formában zajlik, láz apró kiütések, tarkótáji nyirokcsomó duzzanat formájában. A terhesség első harmadában átvészelt fertőzés következménye lehet az ún. **veleszületett rubeola** (fejlődési rendellenességekben jelentkezik).

Az oltóanyag élő, gyengített kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusokat tartalmaz. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a védekező-rendszerre. Általában az 5-12. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél észleltek és 1-2 napnál nem tartanak tovább.

A lázas állapot gondos megfigyelést és szükség esetén lázcsillapítást igényel.

**A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermeke háziorvosát!**

- **dTap védőoltásra kötelezett** a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5.§ és 15.§ alapján iskolai kampányoltás keretében.

A védőoltás 3 súlyos betegség: a **torokgyík** (Diftéria, **D**), a **merevgörccs** (Tetanusz, **T**), a **szamárköhögés** (Pertusszisz **P**) ellen a szervezetben ellenanyag képződést indít el, ami védelmet biztosít ezen megbetegedésekkel szemben.

A **torokgyík** baktérium okozta fertőzőbetegség. A kórokozó főleg a légutakat, néha a bőrt támadja meg. A torokban, rendszerint a mandulákon, ritkán a gégében, vagy más nyálkahártyákon, esetleg a bőrön tapad meg és vastkos szürkéslepedéket hoz létre. Súlyos légzési nehézséget és esetenként fulladást okoz. A baktérium toxint (mérget) is termel, ami idegrendszeri károsodást, szívbetegséget, sőt még halált is okozhat.

A **merevgörccs** igen súlyos, magas halálozással járó betegség. A kórokozó földdel szennyezett seben keresztül jut be a szervezetbe és ott toxint (mérget) termel. A toxin súlyos idegméreg, amelynek hatására az izmok görcsös állapotba kerülnek.



A **szamárköhögés** kínzó köhögéssel, húzó, hangos belégzéssel járó, több hétig tartó bakteriális betegség, mely a légúti váladékcspepekkel terjed.

Az oltás helyén fellépő bőrpír, duzzanat beavatkozás nélkül megszűnik. Jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság.

A lázas állapot gondos megfigyelést és szükség esetén lázcsillapítást igényel.  
**A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermeke háziorvosát!**

## **7. évfolyamos tanulók:**

- **Hepatitis B elleni védőoltásra kötelezett** a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5.§ és 15.§ alapján iskolai kampányoltás keretében. Ez az oltás 2 részből fog állni. Az első részét szeptemberben, míg a második oltást márciusban fogja megkapni.

A **Hepatitis B** egy olyan vírusos fertőző betegség, amely a májat támadja meg és akut, valamint krónikus betegséget is okozhat. A vírus igen magas fertőzőképességgel bír, vérrel és testnedvekkel terjed.

Lehetséges mellékhatások:

Ingerlékenység, fájdalom és bőrpír az injekció helyén, fáradtság, étvágytalanság, fejfájás, álmoság, hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, kemény duzzanat az injekció beadásának helyén, láz, általános rossz közérzet, szédülés, izomfájdalom, kiütés, viszketés, csalánkiütés, ízületi fájdalom.

A lázas állapot gondos megfigyelést és szükség esetén lázcsillapítást igényel.  
**A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermeke háziorvosát!**

- **HPV (humán papillomavírus) elleni VÁLASZTHATÓ védőoltás** az előző tanévekhez hasonlóan 7. évfolyamon a lányok és a fiúk számára is elérhető, mely az iskolai kampányoltás keretében, **térítésmentesen** igényelhető.  
A térítésmentes HPV elleni védőoltásokat iskolai kampányoltás keretében kell végezni. Az iskola-egészségügyi szolgálatokon kívül végzendő oltásokhoz térítésmentes oltóanyag nem biztosított. Az iskola-egészségügyi szolgálat sem adhat ki térítésmentes oltóanyagot iskolán kívüli védőoltáshoz. Amennyiben a háziorvossal, házi gyermekorvossal kívánja beadatni a szülő gyermekének az oltást, ehhez a vakcinát a gyógyszerárban térítés ellenében szerezheti be.

## **Minden védőoltás esetében kérem:**

- A gyermek oltási kiskönyvét, illetve az oltásértesítő alsó részét kitöltve, aláírva szíveskedjenek visszaküldeni.
- Jelezze, ha valamilyen akut vagy krónikus betegség áll fenn gyermekénél, illetőleg, ha bármilyen gyógyszert szed!